

Classification clinique - MGFA

Classe I : Toute faiblesse des muscles oculomoteurs, possible difficulté de fermeture des paupières. La force des autres muscles est normale.

Classe II : Légère faiblesse musculaire, avec faiblesse possible des muscles oculomoteurs de légère à sévère.

- A.** IIa. Affecte principalement les membres ou les muscles axiaux, ou les deux, avec atteinte possible des muscles oropharyngés à un moindre degré.
 - B.** IIb. Affecte principalement les muscles oropharyngés ou respiratoires, ou les deux, avec atteinte possible des membres ou des muscles axiaux, ou les deux, à un degré moindre ou comparable.
-

Classe III : Faiblesse musculaire modérée, avec faiblesse possible des muscles oculomoteurs de légère à sévère.

- A.** IIIa. Affecte principalement les membres ou les muscles axiaux, ou les deux, avec atteinte possible des muscles oropharyngés à un moindre degré.
 - B.** IIIb. Affecte principalement les muscles oropharyngés ou respiratoires, ou les deux, avec atteinte possible des membres ou des muscles axiaux, ou les deux, à un degré moindre ou comparable.
-

Classe IV : Faiblesse musculaire sévère, avec faiblesse possible des muscles oculomoteurs de légère à sévère.

- A.** IVa. Affecte principalement les membres ou les muscles axiaux, ou les deux, avec atteinte possible des muscles oropharyngés à un moindre degré.
 - B.** IVb. Affecte principalement les muscles oropharyngés ou respiratoires, ou les deux, avec atteinte possible des membres ou des muscles axiaux, ou les deux, à un degré moindre ou comparable.
-

Classe V : Intubation, avec ou sans ventilation artificielle, à l'exception de l'intubation dans le cadre de la prise en charge postopératoire normale. Si une sonde gastrique est utilisée, mais sans intubation, la MG est de classe IVb.

Source: Task Force of the Medical Scientific Advisory Board of the Myasthenia Gravis Foundation of America, et coll. Neurology. 2000;55(1):16-23.