

# État posttraitement (MGFA-PIS)

<b>Rémission stable complète (RSC)</b>	Le patient ne présente aucun symptôme ou signe de la MG depuis au moins un an et n'a reçu aucun traitement dans cette période. L'examen rigoureux par un professionnel qualifié en maladie neuromusculaire ne révèle aucune faiblesse musculaire. La faiblesse isolée à la fermeture des paupières est acceptable.
<b>Rémission pharmacologique (RP)</b>	Les mêmes critères que pour la rémission stable complète s'appliquent, mais le patient reçoit un traitement de la MG. Les patients prenant des inhibiteurs de cholinestérase ne font pas partie de cette catégorie, car ces médicaments indiquent la présence de faiblesses.
<b>Manifestations minimales (MM)</b>	Le patient ne présente aucun signe de limitation fonctionnelle liée à la MG, l'examen révèle de la faiblesse musculaire à certains endroits. Cette catégorie tient compte du fait que certains patients correspondant à la définition de RCS ou de RP présentent une faiblesse que seul un examen rigoureux peut détecter.
<b>MM-0</b>	Le patient n'a reçu aucun traitement de la MG depuis au moins un an.
<b>MM-1</b>	Le patient reçoit un traitement immunosuppresseur, mais pas d'inhibiteurs de cholinestérase ni aucun autre traitement symptomatique.
<b>MM-2</b>	Le patient reçoit seulement une faible dose d'inhibiteurs de cholinestérase (< 120 mg de pyridostigmine par jour) depuis au moins un an.
<b>MM-3</b>	Le patient a reçu des inhibiteurs de cholinestérase ou un autre traitement symptomatique et un traitement immunosuppresseur dans la dernière année.
<b>Amélioration de l'état</b>	Importante diminution des manifestations cliniques prétraitement ou réduction importante et graduelle de la médication conformément au protocole. Dans les études prospectives, cette diminution doit se traduire par une diminution du score d'évaluation quantitative de la MG (score QMG).
<b>État stable</b>	Aucun changement majeur dans les manifestations cliniques prétraitement ou aucune réduction importante de la médication conformément au protocole. Dans les études prospectives, cette stabilité doit être définie en fonction d'un changement maximal du score QMG.
<b>Détérioration de l'état</b>	Importante augmentation des manifestations cliniques prétraitement ou augmentation importante de la médication conformément au protocole. Dans les études prospectives, cette augmentation doit se traduire par une augmentation du score QMG.
<b>Aggravation</b>	Patient qui répondait aux critères de RSC, de RP ou de MM, mais qui sont désormais exclus de ces catégories en raison de nouvelles observations cliniques.
<b>Décès dû à la MG</b>	Décès causé par la MG, en raison de complications liées à un traitement de la MG ou dans les 30 jours après une thymectomie.